



Information om gastroskopiundersökning

Undersökningen innebär att en kameraförsedd smal, mjuk slang förs ner genom munnen via matstrupe till magsäcken och tolvfingertarmen. Bilden från kameran överförs till en TV-skärm så att insidan kan inspekteras noggrant. Om så behövs kan man ta små vävnadsprover från slemhinnan för mikroskopisk undersökning.

Undersökningen är smärtfri men kan av vissa upplevas som obehaglig. Lokalbedövning sprayas i svalget för att dämpa kräkreflexen. Vid behov kan även lugnande medel ges.

Själva undersökningen tar inte mer än några minuter. Efteråt får man inte äta eller dricka på en halvtimme, man får äta först då bedövningen släppt i svalget. Man kan i regel arbeta som vanligt efter undersökningen. Om lugnande medel ges får man inte köra bil efteråt och man kan inte alltid räkna med att kunna arbeta som vanligt.

Det är väsentligt att magsäcken är tom före undersökningen. Du får därför inte äta eller dricka sex timmar före undersökningen. Du kan dock ta dina mediciner som vanligt med lite vatten.

Om du har något av nedanstående vill vi att du meddela oss omgående så vi kan ta hänsyn till detta i samband med undersökningen;

- medicinerar med blodförtunnande medel (Waran, Apekumarol)
- har hjärtklaffsjukdom (eller opererad för sådan)
- har hjärtsvikt
- har njursjukdom
- har diabetes